がん種　CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫

レジメン名　リツキサン単独療法

番号	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	備考	投与日 0	1	2	3	4	5	6	7
1	ポララミン錠2mg	1錠	内服	抗がん剤投与30分前			○						
2	カロナール錠200mg	2錠	内服	抗がん剤投与30分前			○						
3	大塚生食注	250mL	静注メイン		ルートキープ＆フラッシュ用		○						
4	ソル・コーテフ注射用100m g	1V	静注側管				○						
5	リツキサン注500mg/50ml	375mg/m^2	静注メイン	**1mg/mLに調整する**			○						
	リツキサン注100mg/10ml												
	大塚生食注	−− mL					○						
	初回投与		開始30分は50mL/ｈ、その後30分毎に50mL/hずつ速度を上げ最大 400mL/ｈまで										
	2回目以降:右記のいずれかに該当する場合は、当該注入速度を選択することができる。		・初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mL/hまで上げて投与を開始し、その後30分毎に100mL/hずつ上げて、最大400mL/hまで ・臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢リンパ球数が5000/μL未満である場合、90分間で投与(最初の30分で投与量の20%を投与し、その後60分で投与量の80%を投与)									

1コース期間（次のコースまでの標準期間）　7日

総コース数　8コース

休薬規定及び減量規定、中止基準	−−−
その他	−−−