がん種　胃癌

レジメン名　ＳＯＸ療法

番号	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	備考	投与日								
						1	2	3	4	5	・・・	14	・・・	21
1	生理食塩水	250mL	点滴静注	ルートキープ＆フラッシュ用		○								
2	アロキシ点滴静注バッグ	1袋	点滴静注側管	15分		○								
	デキサート注射液1.65ｍｇ	6管												
3	５％ブドウ糖液	250mL	点滴静注側管	２時間		○								
	エルプラット点滴静注液	100mg/㎡												
4	エスワンタイホウ配合ＯＤ錠	※その他に記載	内服	day1夕食後~day15朝		○	○	○	○	○	○	○		
5	デカドロン錠４ｍｇ	2錠分１	内服	朝食後			○	○						

1コース期間（次のコースまでの標準期間）　21日

総コース数　制限なし

休薬規定及び減量規定、中止基準

＜減量・中止基準＞

		L-OHP	S-1
好中球数	＜500/mm³	１段階減量	１段階減量
発熱性好中球減少	好中球<1,000/mm³かつ腋窩温38℃以上	１段階減量	１段階減量
血小板数	＜25,000/mm³	１段階減量	１段階減量
	Day29で＜75,000/mm³	１段階減量	１段階減量 (L-OHP50mg/㎡の場合)
下痢,口内炎,手足症候群	≧Grade3	１段階減量	１段階減量
ｱﾚﾙｷﾞｰ/過敏症	≧Grade3	中止	同量継続
末梢神経障害	Grade２	１段階減量 (50mg/㎡の場合は減量せず継続)	同量継続
	Grade３	≦Grade２まで休薬,回復後,減量再開	同量継続
	Grade４	中止	同量継続

＜減量方法＞

	L-OHP	S-1 体表面積		
		＜1.25㎡	≧1.25㎡ ＜1.5㎡	≧1.5㎡
１段階減量	75mg/㎡	25mg/回	40ｍｇ/回	50mg/回
２段階減量	50mg/㎡	20mg/回	25ｍｇ/回	40mg/回

〈同一コース内のS-1休薬・再開基準〉

１５日目までに回復しない場合は次コースまで休薬

	休薬基準	再開基準
好中球数	＜1,000/mm³	≧1,500mm³
血小板数	＜50,000/mm³	≧50,000mm³
AST・ALT	＞ULN×2.5 (肝転移がある場合は×5)	≦ULN×2.5 (肝転移がある場合は×5)
血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ	＞ULN×1.2	≦ULN×1.2
下痢 口内炎 手足症候群	≧Grade2	≦Grade1

その他

S-1初回基準投与量
BSA<1.25㎡：80mg/日（分2）
1.25㎡≦BSA<1.5㎡：100mg/日（分2）
1.5㎡≦BSA：120mg/日（分2）

・ＨＥＲ２（-）