がん種	膵がん
レジメン名	ＧＥＭ+nab-PTX　療法

番号	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	備考	投与日						
						1	…	8	…	15	…	28
1	生食注シリンジ	10mL	静注		投与前フラッシュ用	○		○		○		
2	生理食塩液	250mL	点滴静注		ルートキープ用	○		○		○		
3	アロキシ点滴静注バッグ	1袋	点滴静注側管	15分		○		○		○		
	デキサート注射液1.65mg	4管										
4	生理食塩液	50mL	点滴静注側管	全開		○		○		○		
5	生理食塩液	100mL	点滴静注側管	30分	フィルター使用禁止 5ｍｇ/ｍＬに調整	○		○		○		
	アブラキサン	125mg/㎡										
6	生理食塩液	50mL	点滴静注側管	全開		○		○		○		
7	生理食塩液	100mL	点滴静注側管	30分	200mg 5mL以上 １ｇ　25mL以上で溶解	○		○		○		
	ジェムザール	1000mg/㎡										
8	生食注シリンジ	10mL	静注		抗がん剤終了後のロック用	○		○		○		

1コース期間
（次のコースまでの標準期間）　28日

総コース数　制限なし

休薬規定及び減量規定、中止基準

＜投与の目安＞

	Day　1	Day　８，１５
好中球数	1,500/mm³以上	1,000/mm³を超える
血小板数	100,000/mm³以上	50,000/mm³以上
AST(GOT), ALT(GPT)	施設基準値上限 × 2.5以下	－
発熱性好中球減少症	認めない	
末梢神経障害 (nab-PTXのみ)	Grade２以下　または　前コースでGrade３以上が 発現した場合Grade1以下に回復後	
口腔粘膜炎		
下痢		

＜減量の目安＞

	減量の目安	次回投与時
好中球数	＜500/mm³が７日以上継続	１段階減量
血小板数	＜50,000/mm³	１段階減量
発熱性好中球減少症	発現（≧Grade３）	１段階減量
末梢神経障害	≧Grade３	１段階減量 (nab-PTXのみ)
皮疹	Grade２/３	１段階減量
口腔粘膜炎	≧Grade３	１段階減量
下痢	≧Grade３	１段階減量

＜減量方法＞

	nab-PTX	GEM
通常投与量	125mg/㎡	1,000mg/㎡
１段階減量	100mg/㎡	800mg/㎡
２段階減量	75mg/㎡	600mg/㎡

その他

アブラキサンは、ヒト血清アルブミンを用いた特定生物由来製品であり、同様ジェムザールは必ず30分で投与する。
特定生物由来製品の使用記録は医療機関で使用日から少なくとも２０年間保管。