がん種　胃がん

レジメン名　Nivolumab＋SOX療法

| 番号 | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 備考 | 投与日 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ・・・ | 14 | ・・・ | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生食注シリンジ | 10mL | 静注 | | 投与前フラッシュ | ○ | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液 | 250mL | 点滴静注 | | ルートキープ用 | ○ | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 100mL | 点滴静注側管 | 30分以上 | インラインフィルター（0.2又は0.22μm）を使用 | ○ | | | | | | | | |
| | オプジーボ点滴静注 | 360mg | | | | | | | | | | | | |
| 4 | アロキシ点滴静注バッグ | 1袋 | 点滴静注側管 | 15分 | | ○ | | | | | | | | |
| | デキサート注射液1.65ｍｇ | 6管 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ５％ブドウ糖液 | 250mL | 点滴静注側管 | ２時間 | | ○ | | | | | | | | |
| | エルプラット点滴静注液 | 100mg/㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生食注シリンジ | 10mL | 静注 | | 抗がん剤終了後のロック用 | ○ | | | | | | | | |
| 7 | エスワンタイホウ配合ＯＤ錠 | ※その他に記載 | 内服 | day1夕食後~day15朝 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 8 | デカドロン錠４ｍｇ | 2錠分１ | 内服 | 朝食後 | | | ○ | ○ | | | | | | |

1コース期間（次のコースまでの標準期間）　21日

総コース数　制限なし

**休薬規定及び減量規定、中止基準**

〈減量・中止基準〉

| | | L-OHP | S-１ |
|---|---|---|---|
| 好中球数 | ＜500/㎣ | １段階減量 | １段階減量 |
| 発熱性好中球減少 | 好中球<1,000/㎣かつ腋窩温38℃以上 | １段階減量 | １段階減量 |
| 血小板数 | ＜25,000/㎣ | １段階減量 | １段階減量 |
| | Day29で＜75,000/ｍ㎣ | １段階減量 | １段階減量（L-OHP50mg/㎡の場合） |
| 下痢,口内炎,手足症候群 | ≧Grade3 | １段階減量 | １段階減量 |
| ｱﾚﾙｷﾞｰ/過敏症 | ≧Grade3 | 中止 | 同量継続 |
| 末梢神経障害 | Grade２ | １段階減量(50mg/㎡の場合は減量せず継続) | 同量継続 |
| | Grade３ | ≦Grade２まで休薬,回復後,減量再開 | 同量継続 |
| | Grade４ | 中止 | 同量継続 |

＜オプジーボ＞
Grade2以上の免疫関連有害事象（ｉｒＡＥ）で休薬を考慮

＜減量方法＞

| | L-OHP | S-１ 体表面積 ＜1.25㎡ | ≧1.25㎡ ＜1.5㎡ | ≧1.5㎡ |
|---|---|---|---|---|
| １段階減量 | 75mg/㎡ | 25mg/回 | 40ｍｇ/回 | 50mg/回 |
| ２段階減量 | 50mg/㎡ | 20mg/回 | 25ｍｇ/回 | 40mg/回 |

〈同一コース内のS-1休薬・再開基準〉
１５日目までに回復しない場合は次コースまで休薬

| | 休薬基準 | 再開基準 |
|---|---|---|
| 好中球数 | ＜1,000/㎣ | ≧1,500㎣ |
| 血小板数 | ＜50,000/㎣ | ≧50,000㎣ |
| AST・ALT | ＞ULN×2.5（肝転移がある場合は　×5） | ≦ULN×2.5（肝転移がある場合は　×5） |
| 血清クレアチニン | ＞ULN×1.2 | ≦ULN×1.2 |
| 下痢<br>口内炎<br>手足症候群 | ≧Grade2 | ≦Grade1 |

**その他**

S-1初回基準投与量
BSA<1.25㎡：80mg/日（分2）
1.25㎡≦BSA<1.5㎡：100mg/日（分2）
1.5㎡≦BSA：120mg/日（分2）

・ＨＥＲ２（-）

＜オプジーボ投与時の総液量＞
体重　30kg以上:150mL以下 30kg未満：100mL以下