がん種	悪性リンパ腫
レジメン名	BR療法

番号	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	備考	投与日								
号	采用石	仅分里	仅分万法	投 子时间	1佣石	1	2	3	4			27	28	
1	ポララミン錠 2 mg	1錠	内服	リツキシマブ		0								
2	カロナール錠 200 mg	2錠	内服	投与 30 分前		0								
3	生理食塩液	500 mL	点滴静注		ルートキープ用	0								
4	生理食塩液	適量	点滴静注側 初回50mL/h~			0								
4	リツキサン	375 mg/m^2	管	2回目以降100mL/h~ (※)										
5	アロキシ点滴静注バッグ	1袋	点滴静注側 30 分		Δ	0								
3	デキサート注射液 1.65 mg	6 管	管	30)										
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注側	15 分			0							
0	デキサート注射液 1.65 mg	6 管	管 13 分				O							
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注側	10分	※調製後6時間以内に 投与終了 ※メインの生食と同 時滴下	_	(
/	ベンダムスチン	90 mg/m^2	管			0	0							
8	デカドロン 4 mg	2 錠	内服	朝食後				0	0					

(※) 初回:最初の 30 分は 50 mg/h → 30 分ごとに 50 mg/hずつ、最大 400 mg/hまで上げることができる。 2回目以降:初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、2回目以降は100mg/hで開始し、その後30分ごとに100mg/hずつ上げて、

最大400mg/hまで上げることができる。

1コース期間 (次のコースまでの標準	期間) 28 日	総コース数 	6	
休薬規定及び減量規定、 中止基準	別紙参照			
その他	・適応の確認を行うこと。			