がん種　大腸がん

レジメン名　CapeOX±BV　　催吐リスク分類　中等度

番号	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	備考	投与日					
						1	2	…	14	…	21
1	生理食塩水	250ｍＬ	点滴静注		ルートキープ用	○					
2	ベバシズマブ（アバスチン）	7.5mg/kg	点滴静注 側管	初回90分, 2回目60分, 3回目以降30分	全量100mL	○					
	生理食塩水	100mL									
3	アロキシ点滴静注バッグ	１袋	点滴静注 側管	30分		○					
	デキサート注射液1.65mg	6管									
4	オキサリプラチン（エルプラット）	130mg/m^2	点滴静注 側管	2時間		○					
	大塚糖液5%	250ｍＬ									
5	カペシタビン（ゼローダ錠）	※その他に記載	内服	朝・夕食後	day1夕食後 ~day15朝	○	○	○	○		
6	デカドロン４mg	2錠分1	内服	朝食後			○	○			

1コース期間
（次のコースまでの標準期間）　21日

総コース数　制限なし

休薬規定及び減量規定、 中止基準	各薬剤の添付文書、適正使用ガイド参照
その他	<ゼローダ：投与量＞1000 mg/m^2

体表面積	1回用量
1.36m^2未満	1200 mg
1.36m^2以上1.66m^2未満	1500 mg
1.66m^2以上1.96m^2未満	1800 mg
1.96m^2以上	2100 mg